



Der Haussperling (*a. Passer domesticus*; 15 cm; ♂ Scheitel grau, Kehle schwarz, ♀ oben mattbraun, Brust schwärzlich grau; Jahresvogel, fehlt in Italien) und der Feldsperling (*b. Passer montanus*; 14 cm; ♂ und ♀ mit schwarzem Wangenfleck; Teilzieher; fehlt in Teilen Skandinaviens, Irlands und des Balkans) sind Höhlenbrüter, a in Gebäuden, b in Baumhöhlen. Der Steinsperling (*c. Petronia petronia*; 14 cm; gelber Kehlfleck, weiße Schwanzfleck; Jahresvogel) nistet in Felspalten in den Mittelmeerlandern, früher auch in Deutschland. Sperlings sind Nesthocker; Fam. Weberfinken; Unterfam. Spenglinge.

Rabenvogel sind Nesthocker. Die Dohle, die Elster und der Kollkrabe sind in fast ganz Europa heimisch, letzterer in Deutschland nur in Schleswig-Holstein und in den Alpen; die Saatkrähe (Kolonienvogel) bewohnt Mittel- und Osteuropa. Rabenkrähen nisten westlich der Elbe (Frankreich, Pyrenäenhalbinsel und England), Nebelkrähen östlich der Elbe und im Norden sowie auch in Italien und auf dem Balkan. Bis auf die Dohle (Höhlenbrüter) nisten alle auf Bäumen, der Kollkrabe auch auf Felsen.



wissenschaftl. Name	Kollkrabe	Rabenkrähe	Nebelkrähe	Saatkrähe	Dohle	Elster
	<i>Corvus corax</i>	<i>Corvus corone</i>	<i>Corvus corone</i>	<i>Corvus frugilegus</i>	<i>Colaptes monticola</i>	<i>Pica pica</i>
Größe	65,5 cm	47 cm	47 cm	46 cm	33 cm	46 cm
Besondere Kennzeichen	Schwanzende keilförmig, Schnabel groß, Kehlfederen zottig; Jahresvogel	Körper ganz schwarz, Schnabel groß, Schwanz gerade abgestutzt; Jahresvogel	Rücken und Unterseite grau, Flügel schwarz; Teilzieher	Schnabelgrund glänzend-weiß, Kehlfederen bläulich-grau, Schnabel schwarz; Teilzieher	Gefieder schwarz-weiß, Kehlfederen lang, weiß; Jahresvogel	Gefieder schwarz-weiß, Kehlfederen lang, weiß; Jahresvogel

Der Italiensperling (*a. Passer italiae*; 15 cm; ♂ Scheitel schokoladenbraun, ♀ ähnlich Hausperling; Jahresvogel; Italien) nistet kolonienweise im Unterbau großer Nester, der Weidenperling (*b. Passer hispaniolensis*; 15 cm; Seiten schwarz gestreift; Jahresvogel; Spanien, Korsika und Griechenland) in Felspalten, die Kappensammer (*c. Emberiza melanocephala*; 16,5 cm; ♂ Unterseite gelb, ♀ gelbe Unterschwanzdecken; Jahresvogel; Balkan, Ostitalien) in niedriger Vegetation; a und b sind Weberfinken, c Finkenartige.



Die Rötelschwalbe (*a. Icthyophaga fuscata*; 18 cm; Bürzel rostgelb, Scheitel und Rücken dunkel; Zugvogel; Fam. Schwalben) nistet an Gebäuden und Brücken, der Heckenfänger (*b. Euphonia phoeniceus*; 15 cm; Schwanz an der Spitze gelblich; Jahresvogel; Zugvogel; Fam. Grasmückenartige) in Hecken in Südspanien und auf dem Balkan; die Provencengrasmücke (*c. Sylvia undata*; 13 cm; ♂ Unterseite dunkel purpurbraun; Jahresvogel; Fam. Grasmückenartige) bewohnt Italien, Südfrankreich und Südspanien, wo sie im Gestrüpp nistet.

Der Glettsperling nistet niedrig auf Bäumen in Portugal, der Kurzfangsperber auf dem Balkan (Fam. Adlerartige). Das Rothuhn (Ordnung Hühnervogel, Familie Edite Hühner) und das Laufhühner (Fam. Kampfwachteln) nisten auf dem Boden in Spanien und Portugal, das Rothuhn auch in Süd- und Westfrankreich sowie in Südengland. Blaueistern (Fam. Rabenvogel) bauen ihr Nest auf Bäumen in Spanien und Portugal, Blaueistern (Fam. Drosselartige) in Felspalten und in Gebäuden der Mittelmeerlandern.



wissenschaftl. Name	Glettsperling	Kurzfangsperber	Rothuhn	Laufhühner	Blaueistern	Blaueistern
	<i>Fluvio ceryle</i>	<i>Acipiter brevipes</i>	<i>Alcedo naja</i>	<i>Turdus syriacus</i>	<i>Cyanopica cyanea</i>	<i>Monticola solitarius</i>
Größe	13 cm	33-38 cm	24 cm	17,8 cm	14 cm	20 cm
Besondere Kennzeichen	Schultern schwarz, Kehlfederen dunkel; Jahresvogel	Wangen grau, Unterseite weiß, Kehlfederen dunkel; Jahresvogel	Schnabel und Flügel rot, Kehlfederen gelblich; Jahresvogel	Brust leuchtend rotbraun, Seiten stark gelblich; Jahresvogel	Schwärze Kopfplatte, Flügel und Kehlfederen; Jahresvogel	♂ Gefieder graublaues, Kehlfederen gelblich; Jahresvogel

Die Kurzzeilenlerche (*a. Calandrella brachydactyla*; 14 cm; Brust hell, ungestreift; Zugvogel), die Stummelerche (*b. Calandrella rufescens*; 14 cm; Vorderbrust fein gestreift; Zugvogel) und die Theklalerche (*c. Galerida theklae*; 16 cm; ähnlich Laublerche, aber Brust stärker gestreift; Jahresvogel) nisten am Boden auf Feldern und Ödland in Mittelmeerlandern, die Möhrnerlerche (*d. Melanocorypha yeltoniensis*; 19 cm; ♂ schwarz, Winterkleid weiß geschuppt; Teilzieher) in Südosteuropa; Familie Lerchen.

